

PRIMERAS INDICACIONES,

medios curativos útiles para el Cólera Morbus mientras se consigue un médico, ó para los lugares donde no lo haya, dar pronto socorro á los atacados.

Luego que el enfermo se vea atacado de fuerte dolor de estómago, bascas ó evacuacion, se colocará el enfermo desnudo en su cama entre dos ó mas frazadas que se habrán calentado bien antes y se le dará cada media hora medio posuelo de la bebida núm. 1. con dos gotas de láudano de sidenham: si no disminuyen los síntomas y los vómitos predominan á las evacuaciones, se ordenarán las cucharadas del número 2. tomando una cada cuarto de hora, y se aplicarán sobre el estómago cuatro ó seis docenas de sanguijuelas, segun la edad, fuerza y constitucion del enfermo. Si la diarrea ecsede á los vómitos, se administrarán inmediatamente las labativas contenidas en la fórmula núm. 3. echando una al paciente cada hora, cuidando que cada una no se componga de mas cantidad que un posuelo de líquido y de que este vallu frio, y en este caso se hace uso del mismo número de sanguijuelas, muy cerca del ano por la parte de atras, y de un baño de agua caliente en todo el cuerpo. Se procurará dar á los enfermos cuanta agua fria apetezcan, alternando con limonada ó naranjada hecha en agua de arros, y solo teniendo cuidado de que estas bebidas se den en pequeñas cantidades, es decir á cucharadas y frescas con repeticion, aun cuando las bomiten los enfermos, hasta que calme la sed. Como en esta enfermedad desde el principio hay una gran tendencia al frio de los miembros, se procurará mantener el calor por medio de botellas de agua caliente, ladrillos calientes y sinapismos repartidos en los muslos, pantorrillas y plantas de los pies. Si á pesar de este tratamiento los síntomas aumentan, particularmente la frialdad de los miembros, se dará caliente la bebida aromática contenida en el número 4. en medios posuelos cada media hora é inmediatamente antes de cada toma seis ú ocho gotas de las contenidas en las recetas número 5. en una cucharada de agua fria, y esteriormente se darán frotaciones secas con un cepillo ó franela caliente tambien y se estará frotando las piernas y brazos y toda la espalda con la friega contenida en el número 6. No hallándose el estómago en estado de digerir ninguna clase de alimento de los enfermos del cólera, no se les darán, de ninguna clase mientras los síntomas presenten alguna gravedad y cuando estos fueren leves podrá tomar medio posuelo de atole, no caliente, cada tres horas.

FORMULAS.

Núm. 1.—Arros tostado 2 onzas.—Polvos de cuerno de ciervo 4 onzas.—Goma Arabiga, una cuarta de onza.—Agua 2 cuartillos.

Hágase cocimiento y despues de colado endúlcese con onza y media de jarabe de limon, medio posuelo cada media hora y si lo vomita, una cucharada cada cuarto de hora.

Núm. 2.—Carbonato de sosa una octava parte de onza.—Agua de yerba buena. 6 onzas.—Láudano líquido 24 gotas.—Jarabe de goma 1 onza.

Mézclese y dèse una cucharada cada cuarto de hora, mezclando otra al tiempo de tomarla de agua fria, con 15 gotas de sumo de limon.

Núm. 3.—Linaza 2 onzas.—Almidon una cuarta onza.—Agua 2 cuartillos.

Hágase cocimiento y añádase 40 gotas de láudano para 6 labativas una cada hora.

Núm. 4.—Infusion de mansanilla y yerba buena ligera con poco dulce, medio posuelo cada media hora con seis ú ocho gotas de la siguiente

Núm. 5.—Espíritu de vino media onza.—Amoniáco líquido media dracma.—Aceite de anís 2 gotas.—Alcanfor 9 granos.—Láudano líquido 2 escrúpulos.—Méscelese.

Núm. 6.—Pimienta de Cayena 4 dracmas.—Esencia de yerba buena 1 escrúpulo.—Alcanfor 2 dracmas.—Tintura de valeriana media onza.—Amoniáco líquido 2 dracmas.—Alcol 8 onzas.—Se echa todo en un frasco y se deja en digestion por tres dias para frotaciones en los miembros.
=Matamoros Marzo 3 de 1849.

Esta receta fué bien recibida en Matamoros.

PRIMERAS INDICACIONES.

medios curativos útiles para el Cólera Morbus mien-
tras se consigue un médico, o para los lugares donde
no lo haya, dar pronto socorro a los atacados.

1.º Luego que el enfermo se vea atacado de fuerte dolor de estómago, náuseas ó vómitos, se
colocará el enfermo deitado en su cama entre dos ó tres frazadas que se habrán calentado bien
antes y se le dará cada media hora medio posuto de la bebida número 1. con dos gotas de laudano
de santonina: si no disminuyen los síntomas y los vómitos predominan a las evacuaciones, se or-
denará las cucharadas del número 2. tomadas una cada cuarto de hora, y se aplicará sobre el
estómago cauto ó seis docenas de sanguijuelas, según la edad, fuerza y constitución del enfermo.
Si la diarrea escasea ó los vómitos, se administrarán inmediatamente las lavativas conlutas en
la fórmula número 3. echando una al paciente cada hora, echando que cada una no se componga
de más de libras que un posuto de líquido y de que este sea frío, y en este caso se hará uso del
mismo número de sanguijuelas, una cerca del ano por la parte de atrás y de un dano de agua co-
lante en todo el cuerpo. Se procurará dar a los enfermos cuando una fría opresión, aliviando
con limonada ó agua fría hecha en agua de arroz, y solo tomando cuando de que estas bebidas se
den en pequeñas cantidades, es decir, a cucharadas y 17. seas con repetición, con cuando los vómitos
los espasmos, hasta que como la sed. Como en esta enfermedad desde el principio hay una gran ten-
sión al fero de los miembros, se procurará mantener el calor por medio de botellas de agua co-
lante, lavados calientes y sanguijuelas repartidos en los miembros, paños calientes y plantas de los pies.
Si a pesar de este tratamiento los síntomas aumentan particularmente la frialdad de los miembros,
se dará calientes la bebida aromática conluta en el número 4. en medias posutos cada media hora.
Si inmediatamente antes de cada toma se le oche gotas de los vómitos en las recetas número 5.
en una cucharada de agua fría, y estorvamente se darán frías conlutas secas con un capillo ó frías
calientes también y se estará frotando las piernas y brazos y todo la espalda con la friga conluta
en el número 6. Si a pesar de esto el enfermo no mejora, se dará una clase mixta de santonina presenten alguna vir-
tued y cuando estos fueren leores podrá tomar medio posuto de agua de arroz, cada tres
horas.

FORMULAS.

- Núm. 1.º — Arroz tostado 2 onzas. — Polvos de casaca de huevo 4 onzas. — Canela 1 onza.
cuanto de agua — Agua 2 cuartillos.
Hágase cocimiento y después de colado añádase con agua y media de jarabe de limón, medio
posuto cada media hora y sólo conluta una cucharada cada cuarto de hora.
- Núm. 2.º — Carbonato de sosa una onza parte de agua. — Agua de yerba buena. 6 onzas.
Líquido líquido 24 gotas — Jarabe de goma 1 onza.
Hágase conluta una cucharada cada cuarto de hora, mezclando otro al tiempo de tomarla
de agua fría, con 15 gotas de agua de limón.
- Núm. 3.º — Linaza 2 onzas. — Almidón una cuarta onza — Agua 2 cuartillos.
Hágase cocimiento y añádase 40 gotas de laudano para 6 lavativas una cada hora.
- Núm. 4.º — Infusión de mentanilla y yerba buena ligera con poco dulce, medio posuto cada
media hora con seis u ocho gotas de la siguiente.
- Núm. 5.º — Espíritu de vino media onza. — Almidón líquido media dracma. — Aceite de
anis 2 gotas — Alcapón 2 granos — Laudano líquido 2 escrupulos. — Miel.
- Núm. 6.º — Pimenta de Cayena 4 dracmas. — Esencia de yerba buena 1 escrupulo. — Alcan-
for 2 dracmas. — Jarabe de casaca media onza. — Almidón líquido 2 dracmas. — Aceite de
— 20 gotas de — en un frasco y se deja en digestión por tres días para frotaciones en los miembros.
= Alcapón 1 onza 3 de 1843.
Esta receta fue bien recibida en Matamoros.